

Nome/Razão Social: Raquel Machry Odontologia
CNPJ:54.580.446/0001-61
CRO:28210
Endereço: Rua Gonçalves Dias nº66 Canoas RS

Evolução Odontológica

Nome: Bryan Lima Wojciechowski

Data de Nascimento:21/05/2015

Endereço: Rua Mário Sérgio Gabardo Nº33

Bairro: Estância Velha Canoas RS

Data:11/03/2025

Paciente compareceu no consultório encaminhado pelo Colégio Adventista, acompanhado pelo responsável, mãe.

A responsável relata que o paciente bateu com a face na parede enquanto brincava no pátio da escola.

Ao exame clínico, observo mobilidade dentária, fratura coronária no terço médio/incisal envolvendo esmalte e dentina do elemento 21, podendo ser visto por translucidez o tecido pulpar.

Solicito exame radiográfico periapical da região.

No exame radiográfico, observo rarefação óssea difusa na região periapical do dente 21 devido ao trauma. Fratura no terço médio/incisal também é presente na imagem radiográfica.

Paciente relata não ter queixa de dor nem sensibilidade dentária.

Clinicamente não observo presença de edema.

Indico como tratamento colagem do fragmento e colagem de contenção fixa, devido a mobilidade presente.

Sugiro acompanhamento e controle radiográfico a cada 04 meses.

Caso o paciente venha a ter dor ou edema, está indicado tratamento de canal.

Data:12/03/2025

Realizo limpeza e colagem do fragmento dental dente 21, mais confecção e colagem de contenção fixa para estabilizar o dente devido ao trauma e manter o dente em posição.

Está indicado controle radiográfico a cada 04 meses, teste de vitalidade e observação clínica de sintomatologia de Odontalgia. Se necessário será solicitado tomografia computadorizada da região

Reforço para a responsável, caso o paciente venha a ter dor de dente, edema na região do elemento 21, ou até mesmo necrose do elemento dental, terá que realizar tratamento endodôntico.

Durante a consulta eu, Dra. Raquel Machry, passei para o paciente e para a sua responsável orientações de cuidados, como por exemplo, a indicação de corte dos alimentos a serem consumidos, que necessitem ser abocanhados com os dentes anteriores (dentes da frente), para evitar o risco de fratura do fragmento que foi colado.

Além disso, oriento a responsável a retornar com o paciente em dois (02) meses, para realizar a remoção da contenção, ou retornar imediatamente em caso de Odontalgia.