

Orientação sobre o trauma dental para o responsável

Dentes de leite traumatizados DEVEM ser constantemente avaliados pelos pais e pelo Odontopediatra. Independente do tipo de trauma, leve ou grave, repercussões podem acontecer no próprio dente de leite assim como no dente permanente, que, desde o nascimento do bebê, já se encontra dentro do osso em processo de formação.

A partir de agora, traga imediatamente seu filho(a) no consultório, caso observe algum dos 3 sinais abaixo.

- Amolecimento do dente traumatizado
- Escurecimento do dente traumatizado
- Fistula ("bolinha de pus" na gengiva), sobre o dente traumatizado.

E se eu não visualizar nenhuma destas alterações? Significa que está tudo certo, com certeza? Resposta: NÃO...

...porque os sinais de determinadas alterações só aparecem dentro do osso e só são visíveis na radiografia. Então, no caso do paciente novas radiografias deverão ser realizadas dentro de () 15 dias, () 30 dias, () 45 dias, () 60 dias, () 75 dias, () 90 dias, () 180 dias

Lembre-se de evitar fornecer alimentos duros, assim como chupeta e mamadeira para seu filho, por 7 a 14 dias. A higiene precisa ser bem realizada para acelerar o processo de cicatrização! Qualquer dúvida, entre em contato com a clínica!