

CARNEIRO ODONTOLOGIA

38.732.539/0001-08

Rua Lauro Linhares, 2123 BLOCO B SALA 201 Trindade 88036003 - Florianópolis - SC

Dra. Bruna

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

Paciente: Jose Alejandro

Data do Atendimento: 21/11/2024 Hora do Atendimento: 14h30 Nome do Odontopediatra: Bruna Souza

Procedimentos Realizados no Atendimento:

- Remoção da contenção semi-rígida
- Avaliação dos elementos 11, 12, 21 e 22.
- Elemento 12: Teste de vitalidade positivo; paciente sem relato de sintomatologia. Restauração Classe IV com resina composta (A1 dentina; A1 esmalte (EmpressDirect)); Acabamento e polimento. observo cicatrização periodontal.
- Elemento 11: Elemento com tratamento endodôntico. Paciente sem sintomatologia; observo cicatrização periodontal. Restauração Classe IV com resina composta (A1 dentina; A1 esmalte (EmpressDirect)); Acabamento e polimento.
- Elemento 21: Teste de vitalidade negativo. Descoloração. Paciente com sintomatologia dolorosa. Prognóstico desfavorável. Realizo Restauração Classe IV com resina composta (A1 dentina ; A1 esmalte (EmpressDirect)); Acabamento. Observo cicatrização periodontal.
- Moldagem superior e inferior para realização de protetor bucal.

Procedimentos a serem realizados:

- Tratamento endodôntico do elemento 21
- Restauração após tratamento endodôntico do elemento 21.
- Entrega do protetor bucal e realização de radiografia periapical dos elementos.

Segundo Guideline da IADT:

Prognóstico desfavorável - Rizogênese completa

O paciente pode ou não apresentar sintomas; presença de inchaço e secreção purulenta; dente com mobilidade excessiva ou nenhuma mobilidade (anquilose) com som metálico à percussão. Evidência radiográfica de reabsorção inflamatória ou

substitutiva, ou ambas. Quando a anquilose ocorre em um paciente em crescimento, a infra-oclusão do dente pode prejudicar o crescimento alveolar e facial a curto, médio e longo prazo.

No exame clínico e radiográfico realizado em 21/11/2024, com base nos sinais e sintomas apresentados, foi constatado que o elemento 21 possui prognóstico desfavorável, sendo indicado o tratamento endodôntico. Após a conclusão do tratamento, será necessária a realização de uma nova restauração para o referido elemento. Devido ao escurecimento ou descoloração do dente, resultantes do trauma dentário e/ou do tratamento endodôntico, poderá haver a necessidade de intervenções estéticas adicionais, como a colocação de facetas de resina ou cerâmica, a depender do acompanhamento futuro.

Adicionalmente, foi realizado o molde para confecção de um protetor bucal para o paciente, prmitindo reestabelecer qualidade de vida para o paciente durante atividades escolares, esportivas.