

Paciente: ALLYSON OCOM GUEDES BELO DE OLIVEIRA
Código: 30000000159945
Dr.(a): EDUARDO PELLEGRINO DA ROCHA ROSSI
Exame: RM JOELHO D

Idade: 17 anos
Data: 19/10/2022
AN: 90000742193

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO

Foram obtidas imagens em DP e T2 nos planos ortogonais.

Moderado derrame articular.

As cartilagens hialinas de revestimento articular têm espessura e intensidade de sinal normais.

Discreta alteração de sinais no corno posterior do menisco medial, sem extensão articular.

Menisco lateral anatômico.

Heterogeneidade de sinais e indefinição de contornos do ligamento cruzado anterior.

Espessamento e heterogeneidade de sinais do ligamento colateral lateral, com edema de partes moles adjacentes.

Ligamentos cruzado posterior e colateral medial preservados.

Áreas de edema ósseo subcortical no côndilo femoral lateral e no aspecto posterior do platô tibial.

As demais estruturas ósseas analisadas têm aspecto normal.

Tendões patelar e quadricipital anatômicos.

Os demais músculos do segmento examinado têm aspecto normal.

Mínimo acúmulo de líquido laminar no recesso sinovial semimembranoso-gastrocnêmio medial.

Edema da tela subcutânea ântero-lateral do joelho.

OPINIÃO:

O estudo por ressonância magnética do joelho direito mostra:

Rotura do ligamento cruzado anterior.

Lesão parcial do ligamento colateral lateral.

Áreas de edema ósseo contusionais no côndilo femoral lateral e no aspecto posterior do platô tibial.

Alteração de sinais grau II no menisco medial.

Moderado derrame articular.

Edema da tela subcutânea ântero-lateral do joelho.



Marco Aurélio Soato Ratti
CRM: 34744

Paciente: SAMUEL FERNANDO CORREA DOS SANTO
Código: 30000000160576
Dr.(a): ALEXANDRE E ZANNETTI
Exame: RM TORNOZELO D

Idade: 11 anos
Data: 24/10/2022

AN: 90000745654

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO TORNOZELO DIREITO

Foram obtidas imagens sensíveis ao líquido (DP, STIR e T2) e ponderadas em T1 nos planos ortogonais.
Focos de edema na medular óssea das estruturas do tarso, mais evidentes nos cuneiformes medial e intermédio.
Área de edema ósseo subcondral na base do quinto metatarso, não sendo possível excluir traço de microfratura associado.
Não há evidência de derrame articular.
Espaços e superfícies articulares têm aspecto regular.
Ligamentos colaterais, interósseos e sindesmóticos íntegros.
Demais estruturas ósseas com aspecto normal.
Músculos e tendões sem evidência de alterações.
Fáscia plantar anatômica.
Canal tarsal livre.
Planos adiposos conservados.

OPINIÃO:

O estudo por ressonância magnética do tornozelo direito mostra:
Focos de edema na medular óssea das estruturas do tarso, mais evidentes nos cuneiformes medial e intermédio, que pode representar alteração por sobrecarga mecânica / estresse
Área de edema ósseo subcondral na base do quinto metatarso, não sendo possível excluir traço de microfratura associado.



Mateus Chissini Paganella
CRM: 32826